



ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К УЗИ

Подготовка к УЗИ щитовидной железы

Для проведения УЗИ щитовидной железы специальная подготовка не требуется, так как щитовидная железа располагается поверхностно на шее. Детям и пожилым людям перед исследованием рекомендуется отказаться от приема пищи.



Подготовка к УЗИ молочных желез

Чаще всего УЗИ молочных желез проводят в I фазу менструального цикла - с 5-го по 12-й день от начала менструации. Специальной подготовки для этого не требуется.



Подготовка к УЗИ слюнных желез, лимфатических узлов, УЗИ мягких тканей, УЗИ почек, эхокардиографии (обследование сердца), УЗИ плевральных полостей.

Эти исследования не требуют специальной подготовки.

Подготовка к проведению УЗИ органов малого таза через мочевого пузыря для мужчин и женщин.

За 1.5 часа до исследования выпить постепенно 1-1.5 литра любой жидкости чай, вода, морс, и с полным мочевым пузырем прибыть к назначенному времени исследования.

При невозможности терпеть и сильном позыве, допустимо немного опорожнить пузырь для снятия напряжения и повторно выпить немного жидкости для достижения полного наполнения мочевого пузыря к моменту исследования.

Подготовка к УЗИ органов малого таза. У мужчин трансректальное исследование. У женщин трансвагинальное исследование.

Накануне на ночь сделать очистительную клизму 1.5 литра, либо с утра поставить микроклизму (микролакс) и опорожнить кишечник. Перед исследованием опорожнить мочевой пузырь. Желательно проведение данного исследования натощак.

Подготовка к ультразвуковому исследованию мочевого пузыря.

За 1.5 часа до исследования выпить постепенно 1-1.5 литра любой жидкости чай, вода, морс, и с полным мочевым пузырем прибыть к назначенному времени исследования.

При невозможности терпеть и сильном позыве, допустимо немного опорожнить пузырь для снятия напряжения и повторно выпить немного жидкости для достижения полного наполнения мочевого пузыря к моменту исследования.



Подготовка к УЗИ органов брюшной полости.

За 3 дня до исследования необходимо исключить из рациона продукты вызывающие вздутие кишечника (черный хлеб, цельное молоко, сырые фрукты, овощи и т.п.)

Последний прием пищи в 19.00 предыдущего дня - если исследование утром. Если исследование проводится во второй половине дня, то перерыв в приёме пищи должен составлять не менее 6 часов. Так же хотим обратить внимание, что после проведения ФГДС и ФКС, УЗИ проводится лишь на следующий день, а после пассажа бария и иригографии, не ранее чем через 5 дней после исследования.





Наши контакты:

г. Казань

call-center 8 (843) 202-3-202

Платные услуги 8 (843) 233-82-82

www.oncort.ru

E-mail: rkod.mzrt@tatar.ru